

Dott. Luca Andrea Dessy, Ph.D., D.E.B.O.P.R.A.S.
Dott. Luca Andrea Dessy, Ph.D., D.E.B.O.P.R.A.S.

CONSENSO INFORMATO PER LA TOSSINA BOTULINICA

La tossina botulinica è una neurotossina impiegata da circa 10 anni in campo oftalmico per la cura dello strabismo ed in campo neurologico per la cura degli spasmi muscolari.

Recentemente è stato standardizzato il suo uso per il trattamento delle rughe del volto e per le rughe del collo.

Questo foglio informativo è stato preparato per aiutarvi a comprendere le caratteristiche ed i risultati del trattamento. Siete pregati di leggerlo attentamente e discuterlo col vostro chirurgo chiedendo informazioni in merito a qualsiasi punto poco chiaro.

INFORMAZIONI GENERALI

L'azione della tossina botulinica è quella di indebolire il muscolo attenuando e distendendo così rughe e linee di espressione del distretto cutaneo sovrastante .

Il risultato estetico si ottiene dopo tre o quattro giorni ed è massimo dopo una o due settimane.

L'effetto della infiltrazione della tossina è transitorio ed ha una durata variabile nel tempo (3-8 mesi). Dopo tale intervallo di tempo il paziente potrà ripetere il trattamento se lo desidera altrimenti avrà la certezza di riavere lo stesso aspetto del viso pre-trattamento.

TRATTAMENTO

Si effettua ambulatorialmente mediante infiltrazioni con una siringa con un ago di dimensioni ridottissime (30/32G). In genere non è necessario applicare localmente delle pomate anestetiche nella regione interessata in quanto il trattamento risulta bene tollerato dalla maggior parte dei pazienti. Solo in casi selezionati si utilizzano tali pomate anestetiche. Possono essere necessarie più sedute per ottenere l'effetto desiderato. Il trattamento dura 15-20 minuti .

FASE POST-TRATTAMENTO

Eseguito il trattamento può essere di sollievo applicare del ghiaccio sulla regione interessata. Non è necessario praticare alcuna terapia medica con antibiotici o antidolorifici. Non è un intervento doloroso. Un modico grado di edema potrebbe persistere per qualche settimana o qualche mese. Docce, bagni e shampoo e uso dei cosmetici sono consentiti già dopo 2-4- ore.

Dott. Luca Andrea Dessy, Ph.D., D.E.B.O.P.R.A.S.
Dott. Luca Andrea Dessy, Ph.D., D.E.B.O.P.R.A.S.

CONSENSO INFORMATO PER LA TOSSINA BOTULINICA

Il lavoro e le attività sociali dovrebbero essere ridotte per almeno 24 ore dopo il trattamento.

E' consigliabile effettuare un controllo dal medico dopo 1 settimana .

EFFETTI COLLATERALI

Sono in genere minimi, occasionalmente possono comparire gonfiori, ecchimosi in sede iniettiva, che però si risolvono nel giro di qualche giorno.

Raramente possono essere coinvolti nel rilasciamento muscolare i muscoli adiacenti, fenomeno reversibile nell'arco di qualche settimana.

Occasionalmente può comparire dolore locale e / o mal di testa.

E' controindicato nei pazienti che hanno effettuato l'assunzione di aspirina o farmaci anticoagulanti.

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE

Nelle seguenti situazioni è assolutamente controindicato:

- Ipersensibilità accertata a ciascun componente della formulazione (tossina botulinica, albumina umana, cloruro di sodio).
- In casi di disordini generalizzati dell'attività muscolare (tipo miastenia grave ecc...).
- In pazienti in trattamento con antibiotici aminoglicosidici
- In presenza di infezioni (virale, batteriche, micotiche) o infiammazioni a livello del sito di inoculazione.
- In gravidanza e allattamento.